

膿痂疹

日期：

親愛的家長或監護人：

您的孩子可能在托兒所接觸到**膿痂疹**。

什麼是膿痂疹？

膿痂疹由細菌引起，是一種傳染力極高的皮膚感染，常見於幼童中，也叫做「葡萄球菌」或「鏈球菌」感染，有時可能伴隨感冒或其他呼吸道症狀。

膿痂疹的症狀是什麼？

膿痂疹一開始呈紅色小丘疹狀，然後變成膿疱，並有蜜色的痂/痂皮。膿痂疹通常出現在臉部，但也可能出現在身體的任何部位。

膿痂疹有多嚴重？

膿痂疹如不治療有可能惡化。因此，如果出現任何膿痂疹症狀，請與您的醫生聯絡。膿痂疹很少會導致嚴重疾病。

如何會得到膿痂疹？

造成膿痂疹的細菌存在於感染者的疹疱或鼻子分泌物中。一般人可能因為直接接觸膿痂疹患者的或觸摸受到這種細菌污染的東西而被感染。有時細菌會感染鼻子，然後經由搔撓而感染身體的其他部位。或者，細菌也可能從皮膚上的傷口（如割傷、抓傷或蟲咬）進入體內。

感染膿痂疹之後多久會出現症狀？

疹疱會在感染細菌後 1 到 10 天開始出現。

膿痂疹患者何時具有傳染力？

膿痂疹患者在接受抗生素治療滿 24 小時之前，或是疹疱完全消失之前，都具有傳染力。

如何防止膿痂疹傳播？

- 經常用肥皂和水將手洗淨，尤其是在觸摸疹疱或擦鼻子之後。
- 打噴嚏時捂住鼻子，並將用過的衛生紙扔進垃圾桶。
- 定期清洗和消毒托兒所裡的玩具。
- 避免共用未清洗的衣服、床單、面巾或毛巾。
- 用熱水清洗膿痂疹患者的衣服、床單、面巾或毛巾。
- 孩子在托兒所時，用衣服或繃帶覆蓋患處。
- 將指甲剪短（在家裡剪），避免因搔抓而造成感染。
- 用肥皂和水清洗所有割傷和擦傷。
- 固定用肥皂和水泡澡。

膿痂疹如何治療？

膿痂疹應以抗生素藥膏或口服抗生素治療。

如果我的孩子得到膿痂疹，是否不應上托兒所？

是的，至少要等到孩子服用抗生素滿 24 小時之後。

