



# GIỮ CON Ở NHÀ NẾU

## Con bị sốt




Trẻ em với nhiệt độ 100.4°F hay cao hơn, ho, khó thở, ớn lạnh, đau đầu, nghẹt mũi hoặc sổ mũi, đau họng, mất hương vị hoặc mùi hoặc những triệu chứng bệnh mới không liên quan đến bệnh mãn tính (ví dụ như dị ứng theo mùa)\*

## Con bị tiêu chảy



- 2 lần đi cầu phân lỏng/với nước nhiều hơn bình thường đối với trẻ em trong 24 giờ; HOẶC LÀ
- Có máu hoặc chất nhầy trong phân

## Con cảm thấy không khỏe



Mệt mỏi bất thường, mức độ hoạt động thấp, trông nhợt nhạt, chán ăn, cáu kỉnh, hoặc khóc nhiều hơn bình thường

## Con bị nôn mửa



2 lần hoặc nhiều hơn trong 24 giờ

## Con bị nổi ban, lở loét, chảy rạn, nấm ngoài da hoặc ghẻ



- Phát ban (có thể không liên quan đến phản ứng dị ứng, tã, hoặc nhiệt)
- Vết loét hoặc vết thương bị chảy nước
- Loét miệng và chảy nước dãi
- Chảy, sán hoặc ghẻ không được điều trị

Những triệu chứng bệnh mới và chỉ số nhiệt độ nóng sốt đã được hạ xuống trong thời gian phát bệnh COVID-19 cho tất cả các độ tuổi để phù hợp với khuyến nghị của Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC).

Xin xem những câu hỏi về “Khi nào thì an toàn để trở lại nhà giữ trẻ?” Bộ Luật Hành Chính Washington 110-300-0205 để biết thêm chi tiết về những triệu chứng có cần cách ly khỏi môi trường giữ trẻ hãy xem bảng chỉ dẫn của CDC về: “Những điều gì nên làm khi bạn bị bệnh”: <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/>



**Public Health**  
Seattle & King County 

Chương Trình Chăm Sóc Sức Khỏe Trẻ Em

2008\_10155m\_COVID-19-keep-me-home-Poster-Viet.ai Updated August 2020.