

ዝርዝር-ተግባር፡ ለሕጻናት ማቆያ ተቋማት አስተዳዳሪዎች፡ ኮቪድ-19 የመከላከል እርምጃ

ተግባር	አላስፈላጊ	ተተገበረ	ቀን	ፊርማ
መገናኛ				
በየመግቢያውና መውጫ ስለ አካላዊ መራራቅ፣ ሳልን ስለመሸፈን፣ ኮሙኒቲው ስጦታ አላስፈላጊ እንቅስቃሴዎችን ስለመቀነስ እና በተደጋጋሚ እጅ ስለመታጠብ የሚመክሩ መልእክቶች ለጥፍ				
ከሁሉም ወላጆች፣ ሕጻናት፣ ሰራተኞችና በጎ ፈቃድ ሰራተኞች በሙሉ ቀጣይ ግንኙነት በማድረግ ራሳቸውን ጠብቀው ስርጭቱ እንዳይስፋፋ ምን እርምጃ መውሰድ እንዳለባቸው በሚመለከት ይነጋገሩ።				
ሰራተኞችና ወላጆች ከተቋሙ የሚገናኙበት፣ መረጃ እና ዝመናዎችን የሚያገኙበት እንዲሁም የድምጽ ስጋታቸውን የሚገልጹበት የመገናኛ ዘዴ ያዘጋጁ።				
ትምህርትና ዝግጅት				
ሰራተኞችና ወላጆችን ቀጥለው ስላሉት ርዕሶች አስተምረ፡ <ul style="list-style-type: none"> • የኮቪድ-19 ህመም ምልክቶች • የእጅ ጎጆት እና ሲስተና ሲያስነጥሱ መሸፈን • የጨርቅ የፊት መሸፈኛዎች • መገለልን መቀነስ ለተጨማሪ ምንጮች ኪንግ ካውንቲ ኮቪድ-19 ይጎብኙ።				
ለኮቪድ-19 ዝግጁነት በበለጠ እንዲጠናከር የአስቸኳይ ግዜ ዕቅድዎን ይከፈሉ እና ያዘምኑ።				
በየዕለቱ የተወሰኑ ልጆችና ሰራተኞች በአንድ ቡድን የሚሆኑበት ዕቅድ ያውጡ።				
በየቀኑ የታመሙ ልጆች ይሁኑ ሰራተኞች የሚለዩበትና ወደቤት የሚላኩበት ሂደት በግልጽ ያስቀምጡ። (ለምሳሌ፡ ሕጻን ወላጆችን የሚጠብቅበት ቦታ፣ ሕጻንና ወላጅ የሚያገናኝ ሰራተኛ ማን ነው?)				
መቅረት ወይም በእንክብካቤ ወቅት የሕመም ምልክቶችን የሚያሳዩ ሕጻናትን ለመቆጣጠር እንዲረዱ የበሽተኛ ዝርዝር ቅጽ ማተም።				
ስር የሰደደ በሽታ (አስም፣ አለርጂ... ወዘተ) ያለባቸው ሕጻናት የመንከባከቡ የአስቸኳይ ግዜ ዕቅድዎ ሁሉም ሰራተኛ እንዲያውቁ አድርገው ይከፈሉ።				
ሰራተኞችን ስለ ጽዳት የግዜ ሰሌዳ አስተምሩ፡ እንዲሁም ተቋሙ ውስጥ በተደጋጋሚ ጎጆት (ሳኒታይዘ/ዲስኪንፈክት) የሚያስፈልጋቸው ዕቃዎችና ቦታዎች ለይተው ይወቁ። “ ኮቪድ-19 ግዜ የስርዓተ-ጎጆት ለውጦች ” ስለ በረኪና መሰል ፈሳሽ እና መለያዎች				
በሕጻናት መከከል በቂ አካላዊ መራራቅን የሚፈጥሩ እንቅስቃሴዎች/ተግባሮች ምረጡ።				
ሰራተኞች እንዲሁም 5 እና ከዛ በላይ ዕድሜ ያላቸው ሕጻናት ሁሉ የፊት መሸፈኛ መልበስ አለባቸው (በሕክምና ካልተከለከሉ በስተቀር)። ከ 2-4 ዕድሜ ያላቸው ሕጻናት ተቋም ውስጥ በሚኖሩበት ግዜ የፊት መሸፈኛ ቢለብሱ ይመረጣል። ከ				

2 ዓመት በታች በሆኑ ሕጻናት የፊት መሸፈኛ አታድርጉ።				
"ልጆች በሚመጡበት ጊዜ ማጣርያ" የሲዲሲ መመሪያን በመገምገም ተቋምዎ የትኞቹን ምክሮች ስራ ላይ ማዋል እንዳለበት ይወስኑ።				
በያንዳንዱ የመግብያ በታዎች ለወላጆችና አጣሪ-ቡድን የሚሆን በቂ ቴረሞሜትር አዘጋጁ				

ተግባር	አላስፈላጊ	ተተገበረ	ቀን	ፊርማ
መከላከል				
ከመምጣት በፊት				
<ul style="list-style-type: none"> ስራተኞችና ልጆች በሙሉ ኪፕሚሆም ኢፍ ማግለል የሚለውን መመሪያ መከተል አለባቸው። <p>ሕጻን ይሁን ስራተኛ ሳል፣ የትንፋሽ እጥረት፣ 100.4°F/38°C ወይ በላይ የሰውነት ሙቀት፣ ብርድ፣ የአፍንጫ መታፈን/ሞጫማጫ አፍንጫ፣ የራስ ምታት፣ የጉሮሮ ቁስል፣ የጡንቻ ወይም የአካል ሕመም፣ ድካም፣ ማቅለሽለሽ/ማስታወክ፣ ተቅማጥ፣ አዲስ የተከሰተ የጣዕም ወይም የማሽተት እጦት ወይም ሌላ ቀድሞ ከነበረ ሕመም ግንኙነት የሌለው አዲስ ምልክት (እንደ ወቅታዊ አለርጂ) ካሳዩ እቤት መቆየት አለባቸው። ወቅታዊ የኮቪድ-19 በሽታ ዝርዝር ምልክቶች ለማየት ይህንን የሲዲሲ ኮቪድ-19 ምልክቶች ይጎብኙ።</p>				
ወላጆች/አሳዳጊዎች ወደ ማቆያ ተቋም ከመምጣታቸው በፊት የልጆቻቸው የሰውነት ሙቀት እንዲለኩ ጠይቁ።				
ስራተኞች ወደ ማቆያ ተቋም ከመምጣታቸው በፊት የሰውነታቸው ሙቀት እንዲለኩ ጠይቁ።				
በመምጫ ሰዓት ከወላጆች/አሳዳጊዎች እና ልጆች ጨምሮ ርቀው ይቁሙ (ካልተቻለ ሲዲሲ በሚመክረውን መመሪያ መሰረት የመከላከያ መሰሪያ (PPE) በመልበስ)፡ የሚከተሉትን እርምጃ ይውሰዱ፡				
ወላጅ/አሳዳጊ ወደ ተቋም ከመምጣታቸው በፊት የልጆቻቸውን የሰውነት ሙቀት ለክተው እንደሆነ ይጠይቁ				
ከቤት ሳይወጡ የሰውነት ሙቀት የለኩ እንደሆነ የወላጅ የቴምፕረቸር ሪፖርትን ይዘግቡ።				
<ul style="list-style-type: none"> • የሰውነት ሙቀት እቤት እያሉ ካልወሰዱ ወላጅ/አሳዳጊ በመግብያ በታ እያሉ የልጆቻቸውን ሙቀት እንዲለኩ ይጠይቁ። የቴረሞሜትር መመሪያ እታች ተዘርዝረዋል። (ወላጅ/አሳዳጊ ሙቀት በሚለኩበት ጊዜ ስራተኞች የጨምሮ አካላዊ ርቀት መጠበቅ አለባቸው) 				
<p>ማንኛውም ወላጅ/አሳዳጊ የሚከተሉትን ጥያቄዎች በመጠየቅ ምላሾችን ዘግቡ።</p> <ul style="list-style-type: none"> • ልጅዎ እታች ከተዘረዘሩት ምልክቶች አንዱ አለበት? <ul style="list-style-type: none"> ○ ሳል ○ የትንፋሽ እጥረት ○ የሰውነት ሙቀት 100.4°F/38°C ወይ በላይ 				

<ul style="list-style-type: none"> ○ የአፍንጫ መታፈን ወይ ሞጫማጫ አፍንጫ ○ የራስ ምታት ○ የጡንቻ ወይም የሰውነት ሕመም ወይም ብርድ ○ የጉረሮ ቁስል ○ ድካም ○ ማቅለሽለሽ፣ ማስታወክ ወይም ተቅማጥ ○ አዲስ የመቅመስ ወይም የማሽተት እጦት <ul style="list-style-type: none"> ○ ወይም ቀድሞ ከነበረ ሕመም ግንኙነት የሌለው ሌላ አዲስ ምልክት፡ (እንደ ወቅታዊ አለርጂ) • ልጅዎ ኮቪድ-19 እንዳለበት ከተረጋገጠ ሰው የቅርብ ግንኙነት አድርገዋልን? • ልጅዎ ወደ ማቆያ ተቋም ከመምጣቱ በፊት የትኩሳት ማስታገሻ መድሃኒት ወሰደ? • ልጅዎ ባለፉት 10 ቀናት ውስጥ የኮቪድ-19 ምርመራ ወስዶ አዎንታ ውጤት አገኝተዋል (የአክቲቭ ቫይረስ)? • ባለፉት 14 ቀናት፡ የህዝብ ጤና ወይም የጤና ባለሙያ ስለ ኮቪድ-19 ወረርሽኝ በመስጋት፡ ልጅዎን እንዲከታተሉ፣ ለብቻ እንዲያደርጉ፣ ወይም ከሌሎች እንዲርቅ ነግሮዎታል? <p>እላይ ካሉት ጥያቄዎች አንዱም ቢሆን “አዎ” የሚል መልስ ካገኙ ልጁ ወደ ተቋሙ መግባት የለበትም።</p>				
ተግባር	አላስፈላጊ	ተተገበረ	ቀን	ፊርማ
ቀኑን ሙሉ				
<p>ሕጻናት የሕመም ምልክት ያሳዩ እንደሆነ በዓይን ይቃኙ። ምልክቶቹ እንደ የጉንጭ ቀለም መቀየር፣ ፈጣን መተንፈስን ወይም የመተንፈስ ችግር (አለምንም አካላዊ እንቅስቃሴ፣ የሰውነት ድካም ወይም ከተለመደው ባህሪ ውጭ ማሳየት)።</p>				
<p>የማቆያ ተቋም ሰራተኞች ሕጻናቱ ምልክት ማሳየት ጀምረው እንዳይሆን የሰውነታቸውን ሙቀት ይለኩ።</p>				
<p>ሰራተኞች ምልክት ማሳየት ጀምረው እንዳይሆን የገዛ ራሳቸው ሙቀት ይለኩ።</p>				
<p>ሰራተኞች የሰውነት ሙቀት መለካት ከፈለጉ ተዘጋጅቶ የቀረበ <u>የቴሌሞሜትር መመሪያ ይከተሉ</u>፣ የሚከተሉትንም ጭምር፡</p> <ul style="list-style-type: none"> • ከተቻለ አለንክኪ፡ ልጆቹን ሳይነኩ ከሩቁ የሰውነት ሙቀት የሚለካ፡ ቴሌሞሜትር ተጠቀሙ። • አለንክኪ ቴሌሞሜትር ከተጠቀሙ ዳንት መልበስ/እጅ መታጠብ/የእጅ ንጽህና ልምዶች አስፈላጊ አይደሉም። 				
<p>እንደ ዲጂታል ቴሌሞሜትር እና የግንባር ስክነር የመሳሰሉ የንክኪ ቴሌሞሜትር እየተጠቀሙ ከሆነ በተቻለ መጠን ዳንት ይልበሱ። የሕጻናት የሰውነት ሙቀት በሚለኩበት ጊዜ ዳንት ከመልበስ ፈንታ እጅን በሰውና መታጠብ ወይም ሳይታይ ወይም መጠቀም ይቻላል። አለንክኪ ካልሆነ በስተቀር ቴሌሞሜትር አንዴ ተጠቅመን እንደገና ከመጠቀማችን በፊት ዲስ-ኢንፈክት ማድረግ አለብን።</p>				
<p>ተቋምዎ ደጋግመው የሚያጸዱበትን ብዛት በመጨመር ሶስቱ የ ማጽዳት፣ ማለቅለቅ፣ ሳይታይዝ/ዲስ-ኢንፈክት እርምጃ ይከተሉ 1. ማጽዳት 2. ማለቅለቅ እና 3.</p>				

<p>ሳኒታይዥ/ዲስኢንፈክት። ለተጨማሪ በኮቪድ-19 የማጽዳትና ዲስኢንፈክት ማድረግ ሰነድ ይጎብኙ።</p>				
<p>በረኪና (Bleach) ካልሆነ በስተቀር ለጽዳት የሚጠቀሙበት ኬሚካል የጥቅም ፈቃድ (ላይሰንስ) ያለበት መሆን አለበት። ጸረ ኮቪድ-19 ቫይረስ ተብለው በ EPA የጸደቁ የጽዳት ምርቶች ዝርዝር እዚህ ማግኘት ይቻላል።</p>				
<p>ሳሙና/ውሃ/የወረቀት ፎጣ ወይም የእጅ ሳኒታይዘር (60% ኣልኮሆል) ያለበት የእጅ የንጽህና ጣብያዎች ያዘጋጁ። ጣብያዎቹ ከህንጻ ውጭም ማዘጋጀት አለባቸው።</p>				
<p>የእጅ ሳኒታይዘር በልጆች ላይ በሚጠቀሙበት ግዜ፡</p> <ul style="list-style-type: none"> • በሕጻኑ ላይ ከመጠቀማችን በፊት ዓመታዊው የፈቃድ ቅጽ በወላጅ/አሳዳጊ መሞላቱን ማረጋገጥ አለብን። • ከ2 ዓመት ዕድሜ በታች በሆኑ ሕጻናት መጠቀም የለብንም። 				

የስያትልና ኪንግ ካውንቲ ህዝብ ጤና መመሪያ የአካባቢያችንን ሁኔታ ግምት ውስጥ በማስገባት የሀብረተሰቡን ጤናና ደህንነት ለመጠበቅ ያለን ቁርጠኝነት ያንጸባርቃል። ከየአካባቢው፣ ከስተይት እንዲሁም ከብሔራዊ ተቋማት የሚወጡ መመሪያዎች የተለያዩ መሆናቸውን ተገንዝበው ይሆናል።

**ዝርዝር-ተግባር ለሕጻናት ማቆያ ተቋማት ኣስተዳዳሪዎች፡
በተቋምዎ የተረጋገጠ ወይም የተጠረጠረ የኮቪድ-19 ኬዝ በሚኖርበት ጊዜ
መወሰድ ያለባቸው እርምጃዎች**

ተግባር	ኣላስፈላ	ተተገበረ	ቀን	ፊርማ
ሰው ሲታመም መደረግ ያለበት				
በማቆያ ተቋም እያሉ ሕጻናት ወይም ሰራተኞች የሕመሙ ምልክት ካሳዩ				
ኪፕ ሚ ሆም ኢፍ የሚለውን የማግለል መመሪያ ይከተሉ				
ሕጻን ወይም ሰራተኛ በሳል ፣ በአተነፋፈስ ፣ በ 100.4°F / 38°C ወይም ከዚያ በላይ የሙቀት መጠን ካለ ፣ ብርድ-ብርድ ማለት ፣ መጨናነቅ ወይም የአፍንጫ ፍሳሽ ፣ የራስ ምታት ፣ የጉሮሮ ቁስል ፣ የጡንቻ ወይም የአካል ሕመም ፣ ድካም ፣ ማቅለሽለሽ/ማስታወክ ፣ ተቅማጥ ፣ ኣዲስ የተከሰተ የጦሶም ወይም የማሽተት እጦት ወይም ሌላ ቀድሞ ከነበረ ሕመም ግንኙነት የሌለው ኣዲስ ምልክት (እንደ ወቅታዊ ኣለርጂ) የመሳሰሉ ምልክቶች ካሳዩ ከታች ያሉ እርምጃዎችን ይከተሉ።				
ምልክት ላሳዩ ግለሰቦች የበሽተኛ ዝርዝር ቅጽ ይምሉ።				
ለታመመ ልጅ				
የታመሙ ልጅ የወላጅ/አሳዳጊ መምጣት በሚጠበቅበት ጊዜ ልጁን የሚንከባከብና የሚቆጣጠር ሰራተኛ ይመድቡ።				
የታመሙ ልጅ ከሰራተኞችና ከሌሎች ልጆች የሚለይ ሰራተኛ ይመድቡ። የሚቻል ከሆነ የታመሙ ልጅ ሰው በሌለበት የማቆያ ክፍል ሆኖ ወላጅ/አሳዳጊ መጥተው እስኪወስዱት እንዲጠብቅ ያድርጉ።				
ከተቻለ፡ ልጆቹን በሙሉ የታመሙ ልጅ ካለበት (ብዙ ጊዜ ከፈጀበት) ክፍል በማስወጣት ነጻ ወደሆነ ክፍል ይውሰዱ። የታመሙ ልጅ የተጠቀመባቸው ቦታዎች በሙሉ ሌሎች እንዳይገቡበት/እንዳይጠቀሙበት ይዘገ።				
የተመደበው ሰራተኛ የታመሙን ልጅ በሚንከባከብበት ጊዜ የሕክምና ደረጃ ማስክ መልበስ ኣለበት። የታመሙ ልጅ ከ 2 ዓመት ዕድሜ በላይ ከሆነ የፊት መሸፈኛ/ማስክ መልበስ ኣለበት። የተመደበው ሰራተኛ ልጁ የፊት መሸፈኛ/ማስክ በደምብ እንዲለብስ መርዳት ኣለበት።				
የልጁን ወላጅ/አሳዳጊ ኣሳውቅ። በተቻለ መጠን ቶሎ ብለው ልጃቸውን እንዲወስዱ በትሕትና ይጠይቁ።				
ልጁን ለመንከባከብ የተመደበው ሰራተኛ፡ ወላጅ/አሳዳጊ እንደመጡ፡ ልጁን ወደ ተቋም መግብያ ቦታ ኣጅቦት ይሂድ።				
ወላጆች የልጃቸውን ሓኪም ጋር በመደውል ለኮቪድ-19 እንዲመረመር ወይም ወደ ነጻ የምርመራ ጣብያ እንዲወስዱ ይምከሩ።				
ለታመመ ሰራተኛ				
የታመሙ ሰራተኛ ከልጆችና ከሌሎች ሰራተኞች ይለዩ። የታመሙ ሰራተኛ ወደቤት እንዲሄድ ያድርጉ።				
የታመሙ ሰራተኛ ፒክ የሚያረጋቸውን ሰው እስኪመጣላቸውና በተቋሙ ውስጥ እስካሉ ድረስ፣ ወይም ህዝባዊ መጓጓዣ የሚወስዱ ከሆነ የፊት መሸፈኛ/ማስክ እንዲለብሱ ይምከሩ።				
የታመሙን ሰራተኛ ፒክ የሚያረጋቸው ሰው እየጠበቁ ከሆነ፡ በተቻለ መጠን ነጻ በሆነ ክፍል ለብቻ ሆነው እንዲቆዩ ይደረግ።				
የታመሙ ሰራተኛ ሓኪማቸው ጋር እንዲደውሉና የኮቪድ-19 ምርመራ				

እንዲያደርጉ ወይም ወደ [ነጻ የምርመራ ጣቢያ እንዲሄዱ ይምከሩ።](#)

ተግባር	አላስፈላ	ተተገበረ	ቀን	ፊርማ
የታመመው ሰው በታው እንደለቀቀ ማጽዳት እና ዲስኢንፈክት ማድረግ				
<p>የታመመውን ልጅ ሲንከባከብ የቆየው ምድብ ሰራተኛ፡</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. እጅ መታጠብ 2. ልብስ መቀየር፣ ልብሱ እስኪታጠብ በላስቲክ ከትቶ ማሸግ 3. የፊት መሸፈኛ በማውለቅ ፕላስቲክ ባለበት የቆሻሻ መጣያ መክተት ወይም እንኳታጠብ በፕላስቲክ ማሸግ። 4. እንደገና እጅ መታጠብ። 5. አዲስ የፊት መሸፈኛ መልበስ 				
<p>የታመመው ልጅ የተጠቀመባቸው የጨርቅ ዕቃዎች እንደ ብርድ ልብስ፣ አንሶላ እንዲሁም መጨዎቻዎች በፕላስቲክ ውስጥ አስገብቶ ማሸግ፣ ቆይቶም ላውንድሪ ውስጥ ማጠብ።</p>				
<p>የታመመው ግለሰብ ግዜ ያጠፋባቸው ክፍሎች በሙሉ ማጽዳትና ዲስኢንፈክት መደረግ ይኖርባቸዋል። ስለ ተገቢ የበረኪና (Bleach) ኃይል እና አጠቃቀም ለማወቅ በኮቪድ-19 የማጽዳትና ዲስኢንፈክት ማድረግ ሰነድ ይከተሉ።</p> <ul style="list-style-type: none"> • በቂ የአየር ዝውውር እንዲኖር ወደ ውጭ (outdoor) የሚያገናኙ የክፍሎች በሮችና መስኮቶች ይክፈቱ። • ማጽዳትና ዲስኢንፈክት ማድረግ ከመጀመርዎ በፊት በተቻለ መጠን የታመመው ግለሰብ ክፍሉን ለቆ ከወጣ 24 ሰዓት ወይም ተግባራዊ የሆነ ግዜ ይጠብቁ። 				
<p>ለተጨማሪ መረጃ ለሀያናት ማቆያ ተቋማት አስተዳዳሪዎች መመሪያ፣ በተቋም ውስጥ የተረጋገጠ ወይም የተጠረጠረ የኮቪድ-19 ኬዝ ሲከሰት ምን ማድረግ እንዳለብዎት ይጎብኙ።</p>				
መገናኛ				
<p>ስለተከሰተው የተረጋገጠ ወይም የተጠረጠረ የኮቪድ ኬዝ የተቋሙ አስተዳዳሪን አሳውቅ።</p>				
<p>የሚወሰድ እርምጃን ለማስተባበር ወሳኝ የሆኑትን ሰራተኞች፣ መምህራን፣ የጽዳት ሰራተኞች፣ የአመራር አካላትም ጭምር አነጋግር።</p>				
<p>የተረጋገጠ የኮቪድ-19 ኬዝ ካለው ግለሰብ የቅርብ ግንኙነት ያደረጉ ልጆች ካሉ፣ የኮቪድ-19 የተጋላጭነት ማረጋገጫ ደብዳቤ በማዘጋጀት ወላጆቻቸውን አሳውቁ።</p>				
<p>ካስፈለገም ለሰራተኞችና የቅርብ ግንኙነት ላልነበራቸው ልጆች ወላጅ፣ ለመረጃ ብቻ የሚያገለግል የኮቪድ-19 የእውነታ ገጽ ቅጂ መስጠት ይችላሉ።</p>				
<p>አስታውሱ፡ የታመመውን ወይም የተጠረጠረውን ግለሰብ ለይቶ ሊያወጣ የሚችል መረጃ ከሌሎች ቤተሰቦች አትጋሩ።</p>				

<p>የሚቀጥሉት ካጋጠሙ እባክዎን ሕዝብ ጤናን ያሳውቁ፡</p> <ul style="list-style-type: none"> • በተቋም ውስጥ ቆይታ ካደረጉ ግለሰቦች አንድ ወይም ከአንድ በላይ ለኮቪድ-19 ተመርምረው አዎንታዊ ውጤት ካገኙ፡ • ወይም፡ በተቋም ከሚገኙ ሁለት ወይም ከዛ በላይ ልጆች ወይም ሰራተኞች የኮቪድ-19 ምልክት ካሳዩ፡ <p>የሕዝብ ጤና ባለስልጣን ለማሳወቅ፡</p> <ul style="list-style-type: none"> • የኮቪድ-19 የስልክ ጥሪ ማእከል 206-477-3977 ከጥዋት 8:00 AM እስከ 7:00 PM ባለ ግዜ ይደውሉ። ምርጫ 3 ይምረጡ። እባክዎን የሕጻናት ማቆያ ተቋም ባልደረባ መሆንዎን ያሳውቁ። አስተርጓሚ ካስፈለገ ይቀርብልዎታል። <p>ወይም</p> <ul style="list-style-type: none"> • ወደ አንላይን ቅጽ በመሄድ የኮቪድ-19 መመዝገብ ያሳውቁ። የሕዝብ ጤና በስልክ ወይም በኢሜይል መልስ ይሰጥዎታል። 				
<p>ፈቃድ (ላይሰንስ) የሰጥዎትን አካል አዎንታዊ ኬዝ እንደተከሰተ ያሳውቁ።</p>				
<p>ለተወሰነ ግዜ ተቋሙን ለመዝጋት እያሰቡ ከሆነ፡</p>				
<p>የኮቪድ-19 የስልክ ጥሪ ማእከል 206-477-3977 ከጥዋት 8:00 AM እስከ 7:00 PM ባለ ግዜ ይደውሉ። ምርጫ 3 ይምረጡ። እባክዎን የሕጻናት ማቆያ ተቋም ባልደረባ መሆንዎን ያሳውቁ። አስተርጓሚ ካስፈለገ ይቀርብልዎታል።</p>				

የስደት ስርዓት ኪንግ ካውንቲ ሕዝብ ጤና መመሪያ የአካባቢያችንን ሁኔታ ግምት ውስጥ በማስገባት የህብረተሰቡን ጤናና ደህንነት ለመጠበቅ ያለን ቁርጠኝነት ያንጸባርቃል። ከየአካባቢው፣ ከስተይት እንዲሁም ከብሔራዊ ተቋማት የሚወጡ መመሪያዎች የተለያዩ መሆናቸውን ተገንዝበው ይሆናል።