


# 我什麼時候能再次與其他人在一起？

**在以下前提下可以再次與其他人在一起：**

- 3天無發燒 以及
- 離症狀首次出現已經有10天 以及
- 其他症狀有所改善



## 例子 1:

艾米在星期一生病了。她的咳嗽好轉，並且在星期四退燒了。即使她覺得幾乎恢復正常，她仍需要等到下星期五(滿10天)才可以出家門。

星期一

星期二

星期三


星期四

星期五

星期六

星期日

開始發燒




0

1

2

退燒



3

4

5

6


7

8

9

10





## 例子 2:

阿爾伯特在星期一生病了,發燒和咳嗽了整整10天。他需要在退燒後繼續留在家中3天。這意味著他必須在家中隔離直到星期天。只要他的其他呼吸道症狀有所改善,他星期一就可以出去。

星期一

星期二

星期三


星期四

星期五

星期六

星期日

開始發燒



0

1

2


3

4

5

6

退燒



10

7

8


9

11

12

13





### 例子 3:

薩莎的伴侶在星期一生病了，並伴有咳嗽、發燒和呼吸急促。因此她的伴侶在單獨的房間隔離。薩沙在雜貨店當收銀員，感覺身體無恙。然而，由於薩莎與她生病了的伴侶有密切接觸，她需要自最後一次他們接觸開始算起在家裡隔離並停止上班滿14天。薩莎也應該接受 COVID-19 測試。

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

星期六

星期日

薩莎進行隔離



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14





## 例子 4:

克裡斯和他的妻子、女兒和兒子住在一起。他的妻子和女兒因COVID-19而生病。由於他女兒恢復得很快,她可以在10天後出門。他妻子的症狀維持了一個多星期,所以退燒後還需要隔離3天。克裡斯和他的兒子不覺得身體不舒服,但因為妻子是家中最後一個感染者,他們應該接受COVID測試,並在妻子的隔離期結束後留在家中14天。

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

星期六

星期日

家裏有成員生病, 每個人開始留在家裡。

女兒的燒退了

妻子的燒退了

女兒沒有傳染性, 可以出門


妻子不再有傳染性, 可以出門

克裡斯和他的兒子可以安全出門



1

2



3


4

5

6

7

8



9

10



11

12



13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

