

تحذير الفنتانيل لأولياء الأمور والطلاب

للأسف، حدثت زيادة حديثة في عدد الوفيات الناجمة عن تناول جرعة زائدة في مقاطعة كينج، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى الفنتانيل الموجود في الحبوب والمساحيق غير المشروعة. تحدث هذه الوفيات بشكل متكرر أكثر بين الأشخاص 18 أو أصغر سناً.

تحذير:

- احذر الحبوب المزيفة التي قد تبدو مثل الأدوية الموصوفة. من المحتمل أنها تحتوي على الفنتانيل.
- لا تستهلك أي حبوب لا تتلقاها مباشرة من صيدلية أو من يصفها لك.
- الحبوب التي يتم شراؤها عبر الإنترنت ليست آمنة.

ما هو الفنتانيل؟

الفنتانيل هو عقار أفيوني اصطناعي قوي أقوى بنحو 100 مرة من أفيونيات أخرى. غالباً ما يضاف الفنتانيل إلى العقاقير الغير مشروعة في الشوارع مثل الحبوب المزيفة والمسحوق الأبيض. يسبب الفنتانيل وغيره من المواد الأفيونية جرعة زائدة من خلال إبطاء التنفس ويمكن أن يؤدي في النهاية إلى الوفاة.

أين ظهرت الفنتانيل محلياً؟

- في مقاطعة كينج، يُظهر الفنتانيل بشكل شائع في حبوب مقلدة زرقاء أو خضراء أو شاحبة اللون. قد يكون هناك ألوان أخرى. قد يتم وضع علامة على هذه الأقراص على أنها "M30" وأحياناً باسم "K9" و "215" و "V48". قد يكون الفنتانيل أيضاً في مساحيق بيضاء.

تم العثور على الفنتانيل محلياً في هذه المواد

حبوب M30
هذه هي الحبوب الأكثر شيوعاً التي تحتوي على الفنتانيل في منطقتنا.



حبوب A215 و V48
هذه الحبوب على الرغم من أنها أقل شيوعاً، فقد تحتوي أيضاً على الفنتانيل



مساحيق
يمكن العثور على الفنتانيل أيضاً في مساحيق بيضاء



Public Health
Seattle & King County

- حبوب الاوكسيكودون التي تباع في الشارع أو عبر الإنترنت تحتوي على الأرجح على الفنتانيل.
- لا يمكنك شم أو تذوق الفنتانيل. لا يمكنك معرفة ما إذا كان هناك فنتانيل في الحبوب من خلال النظر إليها.
- يمكن أن تختلف كمية الفنتانيل بين الحبوب، حتى داخل نفس الدفعة. في حين أن حبة واحدة قد تزيد من النشوة للشخص دون قتلهم، إلا أن حبة أخرى قد تكون قاتلة.

ماذا يجب القيام به لمنع الجرعة المميتة:

- معرفة علامات الجرعة الزائدة أو الإفراط في استخدام المواد الأفيونية. شخص ما قد يكون تحت جرعة زائدة إذا:
 - لا يستيقظون أو يصعب إيقاظهم
 - يكون التنفس بطيئاً أو معدوماً
 - بشرة شاحبة، رمادية، جلد بارد
 - لديهم شفاه أو أظافر زرقاء
 - نمط الشخير غير طبيعي (على سبيل المثال، بصوت عال بشكل غير عادي)
 - النعاس الشديد
- إذا شاهدت شخص عنده جرعة زائدة، اتصل بالرقم 1-1-9 على الفور. يحميك القانون السامري الصالح لولاية واشنطن والشخص الذي يتناول جرعة زائدة من تهمة حيازة المخدرات.
- أعط **naloxone (Narcan)**، رذاذ الأنف الذي يعالج الآثار التي تهدد الحياة لجرعة زائدة من المواد الأفيونية. لمعرفة أين يمكنك الحصول على Narcan ادخل موقع stopoverdose.org.



- تخلص من الأدوية غير المستخدمة أو منتهية الصلاحية. ابحث عن صناديق الوضع بالقرب منك: www.medicinerecovery.org أو أرسل رسالة نصية MEDS إلى 667873.
- إذا كنت تعتقد أن شخصاً ما يتناول جرعة زائدة، فلا تدعه ينام.

العلاج يعمل

تتوفر العديد من خيارات العلاج المختلفة في مقاطعة كينك، بما في ذلك الأدوية لعلاج اضطراب استخدام المواد الأفيونية. تفضل بزيارة خط مساعدة المعافاة في واشنطن <http://www.WARecoveryhelpline.org> أو اتصل بالرقم

1-866-789-7511